

ACTUALITES DE L'ETE



Le point sur l'allergie

La démarche diagnostique requiert 2 étapes selon la nomenclature des actes de biologie médicale :

- une première étape clinique (interrogatoire et tests cutanés)
- une seconde étape biologique

Diagnostic biologique de l'allergie respiratoire :

► Dépistage : PHADIATOP®

Mélange de pneumallergènes courants (composition secrète !) : acariens, animaux, pollens d'arbres, graminées, herbacées, moisissures

Attention car ne comprend pas : Blatte, Latex, Cyprès
Cotation B51

► Identification des allergènes :

- 5 **RAST** par ordonnance maximum (5x B51)
- ou **DHS CLA Pneumallergènes** : 30 allergènes sur un même support (B80)

Diagnostic biologique de l'allergie alimentaire :

► Dépistage : TROPHATOP® Enfant ou Adulte

Peut être prescrit avec le Phadiatop

3 mélanges d'aliments sont testés (3 x B51)

► Identification des allergènes :

DHS CLA Trophallergènes : 30 allergènes testés (B80)

Remarque : *Le dosage des **IgE totales** ne doit pas être prescrit en dépistage* (non cumulable avec aucun autre test d'allergie, et nombreuses causes d'IgE totales élevées).

MEMO PRESCRIPTION :

- ✓ Dépistage : PHADIATOP et/ou TROPHATOP
- ✓ Si positif : DHS-CLA

Le calendrier vaccinal 2013 simplifié

Enfants :

- DTCaP-Haemoph+HepB+Pneumo : 2-4-11 mois, puis 6 ans et 11-13 ans
- ROR : 12 mois puis 16-18 mois

Adultes :

- 25 ans : dTP (+coqueluche si pas fait depuis 5 ans)
- 45 ans et 65 ans : dTP
- à partir de 65 ans : tous les 10 ans dTP +/- grippe 1/an

Voir l'ensemble des recommandations sur :

www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal-2013

www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH

Diagnostic de l'insuffisance rénale chronique

La fonction rénale doit être évaluée à partir de la créatininémie, par l'estimation du DFG selon l'équation CKD-EPI. Afin de suivre les recommandations de l'HAS, nous ne rendrons plus que le **DFG CKD-EPI** sur nos compte-rendus de résultats .

De ce fait, il n'est plus nécessaire de renseigner le poids des patients.

Diabète de type 2 : recommandations HAS du 13 janvier 2013

Les nouvelles recommandations de l'HAS préconisent une cible de **l'HbA1c de 7%** pour le traitement du diabète de type 2.

Recommandations sanitaires pour les voyageurs BEH 22-23 du 4 juin 2013

« Sous le soleil exactement... »

www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH



Toute l'équipe BIOLIA vous souhaite de bonnes vacances et vous assure de sa présence en continu durant tout l'été.