

Nom : _____ Prénom : _____
 Date de naissance : __/__/____ Sexe : M F
 Adresse : _____
 Tél. : _____

Date et heure de recueil : le __/__/__ à __ h __ A domicile Au laboratoire

Conditions de recueil : classique ou « à la volée » urinocol (poche)

- L'enfant a-t-il de la fièvre (plus de 38°C) ? OUI NON
- Autre indication de l'analyse urinaire :
- Prend-il des antibiotiques ?
Si oui, lequel ?
- Il s'agit d'un contrôle avant traitement
- Il s'agit d'un contrôle après traitement

INSTRUCTIONS DE RECUEIL :

- Se laver les mains au savon
- Faire une toilette vulvaire chez la fille ou du prépuce et du gland chez le garçon (au savon ou avec la lingette fournie par le labo)
- Deux techniques de recueil sont réalisables :

- **Recueil « à la volée »** : technique à privilégier

Tenir l'enfant sur ses genoux, sans couche ou couche ouverte, et se tenir prêt à recueillir les urines « à la volée » au moment de la miction spontanée (toutes les 30 minutes en général)

- **Recueil avec une poche** :

Sortir la poche de son emballage et retirer le revêtement qui protège l'adhésif. Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence.

Si l'enfant n'a pas uriné au bout d' **1 heure**, retirer la poche, la jeter, refaire une toilette et mettre en place une poche neuve.

Une fois les urines recueillies, bien fermer la poche en faisant adhérer les bords et la déposer dans le flacon.

- Fermer le flacon et le ramener rapidement au laboratoire
- Remplir cette fiche de renseignements et l'apporter avec l'échantillon.

**Il est recommandé d'apporter les urines dans les 2 heures.
Elles peuvent être conservées au frigo, 24 heures maximum.**

Nom : _____ Prénom : _____
 Date de naissance : __/__/____ Sexe : M F
 Adresse : _____
 Tél. : _____

Date et heure de recueil : le __/__/__ à __ h __ A domicile Au laboratoire

Conditions de recueil : classique ou « à la volée » urinocol (poche)

- L'enfant a-t-il de la fièvre (plus de 38°C) ? OUI NON
- Autre indication de l'analyse urinaire :
- Prend-il des antibiotiques ?
Si oui, lequel ?
- Il s'agit d'un contrôle avant traitement
- Il s'agit d'un contrôle après traitement

INSTRUCTIONS DE RECUEIL :

- Se laver les mains au savon
- Faire une toilette vulvaire chez la fille ou du prépuce et du gland chez le garçon (au savon ou avec la lingette fournie par le labo)
- Deux techniques de recueil sont réalisables :

- **Recueil « à la volée »** : technique à privilégier

Tenir l'enfant sur ses genoux, sans couche ou couche ouverte, et se tenir prêt à recueillir les urines « à la volée » au moment de la miction spontanée (toutes les 30 minutes en général)

- **Recueil avec une poche** :

Sortir la poche de son emballage et retirer le revêtement qui protège l'adhésif. Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence.

Si l'enfant n'a pas uriné au bout d' **1 heure**, retirer la poche, la jeter, refaire une toilette et mettre en place une poche neuve.

Une fois les urines recueillies, bien fermer la poche en faisant adhérer les bords et la déposer dans le flacon.

- Fermer le flacon et le ramener rapidement au laboratoire
- Remplir cette fiche de renseignements et l'apporter avec l'échantillon.

**Il est recommandé d'apporter les urines dans les 2 heures.
Elles peuvent être conservées au frigo, 24 heures maximum.**