

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F

Nom de naissance : _____ Date de naissance : ____ / ____ / ____

Adresse : _____

Tél. : _____ E-mail : _____

Autoprélèvement effectué le ____ / ____ / ____ à ____ h ____

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Grossesse : oui non Si oui DDR : ____ / ____ / ____


Traitement en cours : oui non antibiotique antiparasitaire antimycosique
Si oui, lequel : _____

Date du dernier frottis du col : ____ / ____ / ____

GUIDE DE PRELEVEMENT :


Précautions à prendre : se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement

FIGURE 1




1. Ouvrir partiellement le sachet contenant l'écouvillon et le tube.
2. Enlevez l'écouvillon du sachet sans toucher le coton, ni le reposer.
3. Tenir l'écouvillon comme le montre la figure 1, en le plaçant entre le pouce et l'index au milieu de la tige.

FIGURE 2




4. Introduisez doucement l'écouvillon dans le vagin sur une distance de 3 cm (figure 2), et tournez doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes. Assurez vous que l'écouvillon touche les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.
5. Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.

FIGURE 3



6. Pendant que vous tenez l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube. Veillez à ne pas renverser le contenu du tube. Si cela arrive, redemandez un nouveau kit de prélèvement.
7. Placez immédiatement l'écouvillon dans le tube (milieu de transport) : le coton touche le fond du tube.
8. Cassez la tige au niveau indiqué en la pressant contre le bord (figure 3).

FIGURE 4



9. Revissez le bouchon (figure 4).
10. Après avoir bien refermé le tube, conservez-le à température ambiante et rapportez le au laboratoire dans un délai de 24 heures (48 heures maximum).

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F

Nom de naissance : _____ Date de naissance : ____ / ____ / ____

Adresse : _____

Tél. : _____ E-mail : _____

Autoprélèvement effectué le ____ / ____ / ____ à ____ h ____

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Grossesse : oui non Si oui DDR : ____ / ____ / ____


Traitement en cours : oui non antibiotique antiparasitaire antimycosique
Si oui, lequel : _____

Date du dernier frottis du col : ____ / ____ / ____

GUIDE DE PRELEVEMENT :


Précautions à prendre : se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement

FIGURE 1




1. Ouvrir partiellement le sachet contenant l'écouvillon et le tube.
2. Enlevez l'écouvillon du sachet sans toucher le coton, ni le reposer.
3. Tenir l'écouvillon comme le montre la figure 1, en le plaçant entre le pouce et l'index au milieu de la tige.

FIGURE 2




4. Introduisez doucement l'écouvillon dans le vagin sur une distance de 3 cm (figure 2), et tournez doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes. Assurez vous que l'écouvillon touche les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.
5. Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.

FIGURE 3



6. Pendant que vous tenez l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube. Veillez à ne pas renverser le contenu du tube. Si cela arrive, redemandez un nouveau kit de prélèvement.
7. Placez immédiatement l'écouvillon dans le tube (milieu de transport) : le coton touche le fond du tube.
8. Cassez la tige au niveau indiqué en la pressant contre le bord (figure 3).

FIGURE 4



9. Revissez le bouchon (figure 4).
10. Après avoir bien refermé le tube, conservez-le à température ambiante et rapportez le au laboratoire dans un délai de 24 heures (48 heures maximum).