

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_ / \_\_ / \_\_ Sexe :  M  F

Adresse : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

Prélèvement effectué par \_\_\_\_\_ le \_\_ / \_\_ / \_\_ à \_\_ h \_\_

### RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

- troubles intestinaux : douleurs abdominales, diarrhée ...
- prurit anal nocturne (démangeaisons)
- troubles nerveux, troubles du comportement
- vulvovaginite chez la fillette (le prélèvement peut alors se faire au niveau de la vulve)

### INSTRUCTIONS POUR EFFECTUER LE PRELEVEMENT

#### Le port de gants est obligatoire

- Le prélèvement doit être réalisé le matin au lever avant la toilette et les premières selles : préconisation respectée :  oui  non
- Matériel nécessaire : scotch transparent (2 bandes de 5 cm environ), lames en verre, porte-lame
- Appliquer le côté adhésif du scotch sur les plis de la marge anale, appuyer quelques secondes (bien déplier la marge anale)
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame sans faire de bulles d'air
- Recommencer avec le deuxième scotch
- Placer les lames dans le porte-lame, identifier l'étui, placer-le dans un sachet de transport double poche et fermer le sachet
- A rapporter le plus rapidement possible au laboratoire (délai maximum une journée à température ambiante).

Sources : [sante.gouv.fr/préanalytique/parasitologie](http://sante.gouv.fr/préanalytique/parasitologie)

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_ / \_\_ / \_\_ Sexe :  M  F

Adresse : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

Prélèvement effectué par \_\_\_\_\_ le \_\_ / \_\_ / \_\_ à \_\_ h \_\_

### RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

- troubles intestinaux : douleurs abdominales, diarrhée ...
- prurit anal nocturne (démangeaisons)
- troubles nerveux, troubles du comportement
- vulvovaginite chez la fillette (le prélèvement peut alors se faire au niveau de la vulve)

### INSTRUCTIONS POUR EFFECTUER LE PRELEVEMENT

#### Le port de gants est obligatoire

- Le prélèvement doit être réalisé le matin au lever avant la toilette et les premières selles : préconisation respectée :  oui  non
- Matériel nécessaire : scotch transparent (2 bandes de 5 cm environ), lames en verre, porte-lame
- Appliquer le côté adhésif du scotch sur les plis de la marge anale, appuyer quelques secondes (bien déplier la marge anale)
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame sans faire de bulles d'air
- Recommencer avec le deuxième scotch
- Placer les lames dans le porte-lame, identifier l'étui, placer-le dans un sachet de transport double poche et fermer le sachet
- A rapporter le plus rapidement possible au laboratoire (délai maximum une journée à température ambiante).

Sources : [sante.gouv.fr/préanalytique/parasitologie](http://sante.gouv.fr/préanalytique/parasitologie)