

Nom : _____ Prénom : _____

Date de naissance : ___ / ___ / ___ Sexe : M F

Adresse : _____

Tél. : _____

Prélèvement effectué par _____ le ___ / ___ / ___ à ___ h ___

Renseignements cliniques :

- Fièvre au moment du prélèvement ? OUI T° : _____ NON
- Troubles digestifs ? OUI diarrhées nausées vomissements NON

- Autres renseignements : céphalées convulsions grossesse
- Date du début des symptômes :

• Avez-vous voyagé ? OUI NON Pays visité (s) _____

• Motif du voyage : Tourisme Militaire Visite dans le pays d'origine

• Paludisme ancien OUI NON Autre

• Date de retour : ___ / ___ / ___ Durée du séjour : ___ / ___ / ___

• Prophylaxie antipaludéenne ? OUI NON

Si oui, préciser :

- Nivaquine Paludrine Savarine Quinine Lariam Quinimax
- Halfan Malocide Fansidar Malarone Doxypalu Granudoxy

- Traitement poursuivi au retour ? OUI NON
- Observance du traitement : Bonne Mauvaise
- Cas particulier de suivi de traitement de paludisme :
- Contrôle à : J3 J7 J28

Le préleveur prélève du sang veineux sur deux tubes EDTA.

***Le diagnostic de paludisme est une urgence médicale,
le prélèvement est à transmettre sans attendre au laboratoire.***

Nom : _____ Prénom : _____

Date de naissance : ___ / ___ / ___ Sexe : M F

Adresse : _____

Tél. : _____

Prélèvement effectué par _____ le ___ / ___ / ___ à ___ h ___

Renseignements cliniques :

- Fièvre au moment du prélèvement ? OUI T° : _____ NON
- Troubles digestifs ? OUI diarrhées nausées vomissements NON

- Autres renseignements : céphalées convulsions grossesse
- Date du début des symptômes :

• Avez-vous voyagé ? OUI NON Pays visité (s) _____

• Motif du voyage : Tourisme Militaire Visite dans le pays d'origine

• Paludisme ancien OUI NON Autre

• Date de retour : ___ / ___ / ___ Durée du séjour : ___ / ___ / ___

• Prophylaxie antipaludéenne ? OUI NON

Si oui, préciser :

- Nivaquine Paludrine Savarine Quinine Lariam Quinimax
- Halfan Malocide Fansidar Malarone Doxypalu Granudoxy

- Traitement poursuivi au retour ? OUI NON
- Observance du traitement : Bonne Mauvaise
- Cas particulier de suivi de traitement de paludisme :
- Contrôle à : J3 J7 J28

Le préleveur prélève du sang veineux sur deux tubes EDTA.

***Le diagnostic de paludisme est une urgence médicale,
le prélèvement est à transmettre sans attendre au laboratoire.***