

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Sexe :  M  F

Adresse : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

Date et heure de recueil : le \_\_ / \_\_ / \_\_ à \_\_ h \_\_  A domicile  Au laboratoire

**Renseignements cliniques :**

- brûlures mictionnelles
- présence d'un écoulement urétral
- contexte d'infection sexuellement transmissible (IST)
- récurrence d'IST

**Traitement antibiotique :**  OUI  NON  A VENIR

Nom de l'antibiotique : \_\_\_\_\_

Date de début de traitement : \_\_\_\_\_

Si contrôle après traitement, antibiotique arrêté le \_\_\_\_\_

**Conditions pré-analytiques à respecter :**

- Il est recommandé de ne pas avoir uriné dans les 2 heures précédentes
- Ne pas faire de toilette locale avant le recueil
- Reporter l'examen en période de règles ou en cas de prise d'ovule
- Réaliser l'examen avant toute prise d'antibiotiques
- En cas de contrôle après traitement : pour *C.trachomatis* attendre 5-6 semaines après l'arrêt, pour les Mycoplasmes attendre 15 jours

**Instructions de recueil :**

- Recueillir le **début de la miction urinaire = 1<sup>er</sup> jet (10 à 30 ml maximum)** dans le flacon stérile fourni, éliminer le reste des urines dans les toilettes
- Ne pas transférer sur borate
- Si ECBU demandé, recueillir les urines ECBU sur 2<sup>ème</sup> jet dans un 2<sup>ème</sup> flacon

**Il est recommandé d'apporter les urines rapidement après le prélèvement  
(conservation maximum 24h à température ambiante)**

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Sexe :  M  F

Adresse : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

Date et heure de recueil : le \_\_ / \_\_ / \_\_ à \_\_ h \_\_  A domicile  Au laboratoire

**Renseignements cliniques :**

- brûlures mictionnelles
- présence d'un écoulement urétral
- contexte d'infection sexuellement transmissible (IST)
- récurrence d'IST

**Traitement antibiotique :**  OUI  NON  A VENIR

Nom de l'antibiotique : \_\_\_\_\_

Date de début de traitement : \_\_\_\_\_

Si contrôle après traitement, antibiotique arrêté le \_\_\_\_\_

**Conditions pré-analytiques à respecter :**

- Il est recommandé de ne pas avoir uriné dans les 2 heures précédentes
- Ne pas faire de toilette locale avant le recueil
- Reporter l'examen en période de règles ou en cas de prise d'ovule
- Réaliser l'examen avant toute prise d'antibiotiques
- En cas de contrôle après traitement : pour *C.trachomatis* attendre 5-6 semaines après l'arrêt, pour les Mycoplasmes attendre 15 jours

**Instructions de recueil :**

- Recueillir le **début de la miction urinaire = 1<sup>er</sup> jet (10 à 30 ml maximum)** dans le flacon stérile fourni, éliminer le reste des urines dans les toilettes
- Ne pas transférer sur borate
- Si ECBU demandé, recueillir les urines ECBU sur 2<sup>ème</sup> jet dans un 2<sup>ème</sup> flacon

**Il est recommandé d'apporter les urines rapidement après le prélèvement  
(conservation maximum 24h à température ambiante)**