

Nom : _____ Prénom : _____


Date de naissance : ___ / ___ / ___ Sexe : M F

Adresse : _____

Tél. : _____

Prélèvement effectué par _____ le ___ / ___ / ___ à ___ h ___

Localisation	<input type="checkbox"/> Gorge	<input type="checkbox"/> Bouche <input type="checkbox"/> Langue <input type="checkbox"/> Nez <input type="checkbox"/> Narine D <input type="checkbox"/> Narine G	<input type="checkbox"/> Oreille D <input type="checkbox"/> Oreille G <input type="checkbox"/> Conduit auditif externe	<input type="checkbox"/> Frottis conjonctival D <input type="checkbox"/> Frottis conjonctival G <input type="checkbox"/> Boîtier de lentilles <input type="checkbox"/> Cils
	Signes cliniques	<input type="checkbox"/> Éruption cutanée <input type="checkbox"/> Angine rouge <input type="checkbox"/> Angine ulcéronecrotique <input type="checkbox"/> IST	<input type="checkbox"/> Rhino-pharyngite <input type="checkbox"/> Sinusite <input type="checkbox"/> Éruption cutanée <input type="checkbox"/> Candidose <input type="checkbox"/> Muguet	<input type="checkbox"/> Otite moyenne<3 ans <input type="checkbox"/> Otite moyenne>3 ans <input type="checkbox"/> Otite récurrente <input type="checkbox"/> Otite externe
Fièvre <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON				
Traitement antibiotique <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Si oui, lequel ?				

Instructions	Gorge	Langue	Nez	Oreille	Œil
Prendre 1 écouvillon ESWAB (bouchon rose ou orange) 	Le prélèvement se fait le + souvent au niveau des amygdales : • Utiliser un abaisse langue pour le pharynx et éviter le contact salivaire. • L'émission du son Aah permet d'éviter le réflexe nauséeux. • S'il existe un exsudat, on fera le prélèvement à son niveau. • S'il existe des fausses membranes, on fera le prélèvement à leurs périphéries.	Frotter les écouvillons sur la partie supérieure et sur les lésions éventuelles.	Prélever en tournant un écouvillon dans une narine après l'autre.	Prélever l'écoulement en essayant de descendre dans le conduit auditif. Afin de ne pas léser le tympan, on peut faire prélever le patient lui-même, une fois l'écouvillon mis en place.	<ul style="list-style-type: none"> Repérer les zones qui nécessitent le prélèvement :rougeurs, présence de pus, croûtes. Faire souder éventuellement par pression au niveau du cul de sac conjonctival. Récupérer le prélèvement en apposant ou en frottant légèrement l'écouvillon

Sources Rémic 2015

Transmettre le prélèvement le plus rapidement possible au laboratoire (conservation 24H maximum pour le Gonocoque, 48H pour les autres germes)

Nom : _____ Prénom : _____


Date de naissance : ___ / ___ / ___ Sexe : M F

Adresse : _____

Tél. : _____

Prélèvement effectué par _____ le ___ / ___ / ___ à ___ h ___

Localisation	<input type="checkbox"/> Gorge	<input type="checkbox"/> Bouche <input type="checkbox"/> Langue <input type="checkbox"/> Nez <input type="checkbox"/> Narine D <input type="checkbox"/> Narine G	<input type="checkbox"/> Oreille D <input type="checkbox"/> Oreille G <input type="checkbox"/> Conduit auditif externe	<input type="checkbox"/> Frottis conjonctival D <input type="checkbox"/> Frottis conjonctival G <input type="checkbox"/> Boîtier de lentilles <input type="checkbox"/> Cils
	Signes cliniques	<input type="checkbox"/> Éruption cutanée <input type="checkbox"/> Angine rouge <input type="checkbox"/> Angine ulcéronecrotique <input type="checkbox"/> IST	<input type="checkbox"/> Rhino-pharyngite <input type="checkbox"/> Sinusite <input type="checkbox"/> Éruption cutanée <input type="checkbox"/> Candidose <input type="checkbox"/> Muguet	<input type="checkbox"/> Otite moyenne<3 ans <input type="checkbox"/> Otite moyenne>3 ans <input type="checkbox"/> Otite récurrente <input type="checkbox"/> Otite externe
Fièvre <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON				
Traitement antibiotique <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Si oui, lequel ?				

Instructions	Gorge	Langue	Nez	Oreille	Œil
Prendre 1 écouvillon ESWAB (bouchon rose ou orange) 	Le prélèvement se fait le + souvent au niveau des amygdales : • Utiliser un abaisse langue pour le pharynx et éviter le contact salivaire. • L'émission du son Aah permet d'éviter le réflexe nauséeux. • S'il existe un exsudat, on fera le prélèvement à son niveau. • S'il existe des fausses membranes, on fera le prélèvement à leurs périphéries.	Frotter les écouvillons sur la partie supérieure et sur les lésions éventuelles.	Prélever en tournant un écouvillon dans une narine après l'autre.	Prélever l'écoulement en essayant de descendre dans le conduit auditif. Afin de ne pas léser le tympan, on peut faire prélever le patient lui-même, une fois l'écouvillon mis en place.	<ul style="list-style-type: none"> Repérer les zones qui nécessitent le prélèvement :rougeurs, présence de pus, croûtes. Faire souder éventuellement par pression au niveau du cul de sac conjonctival. Récupérer le prélèvement en apposant ou en frottant légèrement l'écouvillon

Sources Rémic 2015

Transmettre le prélèvement le plus rapidement possible au laboratoire (conservation 24H maximum pour le Gonocoque, 48H pour les autres germes)