

Nom : _____ Prénom : _____

Date de naissance : __ / __ / ____ Sexe : M F

Adresse : _____

Tél. : _____

Prélèvement effectué par _____ le __ / __ / __ à __ h __

Renseignements cliniques :

- Fièvre au moment du prélèvement ? OUI T° : _____ NON
- Troubles digestifs ? OUI diarrhées nausées vomissements NON

• Autres renseignements : céphalées convulsions grossesse

• Avez-vous voyagé ? OUI NON Pays visité (s) _____

• Motif du voyage : Tourisme Militaire Visite dans le pays d'origine

• Paludisme ancien OUI NON Autre

• Date de retour : __ / __ / __ Durée du séjour : __ / __ / __

• Prophylaxie antipaludéenne ? OUI NON

Si oui, préciser :

- Nivaquine Paludrine Savarine Quinine Lariam Quinimax
- Halfan Malocide Fansidar Malarone Doxypalu Granudoxy

• Traitement poursuivi au retour ? OUI NON

• Observance du traitement : Bonne Mauvaise

• Cas particulier de suivi de traitement de paludisme :

• Contrôle à : J3 J7 J28

Le préleveur prélève du sang veineux sur deux tubes EDTA.

***Le diagnostic de paludisme est une urgence médicale,
le prélèvement est à transmettre sans attendre au laboratoire.***

Nom : _____ Prénom : _____

Date de naissance : __ / __ / ____ Sexe : M F

Adresse : _____

Tél. : _____

Prélèvement effectué par _____ le __ / __ / __ à __ h __

Renseignements cliniques :

- Fièvre au moment du prélèvement ? OUI T° : _____ NON
- Troubles digestifs ? OUI diarrhées nausées vomissements NON

• Autres renseignements : céphalées convulsions grossesse

• Avez-vous voyagé ? OUI NON Pays visité (s) _____

• Motif du voyage : Tourisme Militaire Visite dans le pays d'origine

• Paludisme ancien OUI NON Autre

• Date de retour : __ / __ / __ Durée du séjour : __ / __ / __

• Prophylaxie antipaludéenne ? OUI NON

Si oui, préciser :

- Nivaquine Paludrine Savarine Quinine Lariam Quinimax
- Halfan Malocide Fansidar Malarone Doxypalu Granudoxy

• Traitement poursuivi au retour ? OUI NON

• Observance du traitement : Bonne Mauvaise

• Cas particulier de suivi de traitement de paludisme :

• Contrôle à : J3 J7 J28

Le préleveur prélève du sang veineux sur deux tubes EDTA.

***Le diagnostic de paludisme est une urgence médicale,
le prélèvement est à transmettre sans attendre au laboratoire.***